

PREPARO PARA RESSONÂNCIA MAGNETICA ABDOME SUPERIOR

ORIENTAÇÕES:

PARA A REALIZAÇÃO COMPARECER NA UNIDADE COM:

Cabelos limpos e secos. (Livres de gel ou cremes);

Roupas sem zíper ou botões. (Mulheres se possível, usar top ao invés de sutiã e calça legging);

Não utilizar nenhuma maquiagem ou cosméticos em qualquer região do corpo;

Sem piercings, anéis, brincos, colares e alianças;

Pacientes que realizaram tatuagens, micropigmentação ou cirurgias só poderão realizar Ressonância Magnética após 3 meses/90 dias;

Cílios postiços/magnéticos deverão ser removidos um dia antes do exame da Ressonância Magnética;

Trazer laudos de exames anteriores da região onde será realizado o exame. (Se houver);

Pacientes menores de 18 anos, indivíduos com declínio cognitivo ou que necessitem de cuidados especiais devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento;

Necessário exame de sangue de URÉIA E CREATININA recente (últimos 03 meses), para os seguintes casos: Pacientes com idade superior a 65 anos; Pacientes com doença renal aguda ou crônica, ou que realizaram transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins, pacientes que realizam hemodialise;

Amamentação e Contraste – Retirar e armazenar o leite antes da realização do exame e suspender a amamentação durante 48 horas após a infusão do contraste;

A execução do exame depende da adequada acomodação do paciente no equipamento de ressonância magnética. Fator importante para clientes com peso superior a 120kg e circunferência corporal acima de 90 cm; Caso tenha o hábito de tomar algum tipo de calmante, sedativo ou relaxante, poderá tomá-lo 1 hora antes do exame, na dosagem em que está habituado.

Medicamentos de rotinas não devem ser suspensos.

É necessário jejum para este exame de 4 horas

CONTRA INDICAÇÃO:

- Clipes de aneurisma cerebral;
- Implantes e aparelhos oculares (exceto lentes intra - oculares para cataratas);
 - Implantes otológicos cocleares (ouvido);
 - Marca-passo cardíaco;
 - Fixadores ortopédicos externos;
 - Qualquer objeto ou artefato metálico;
- Suspeita de gravidez; caso haja dúvida em relação a possível gestação inicial, necessária confirmação com exame de beta-HCG.
- Lesões abertas (pé diabético, lesões na pele, machucados apresentando secreção, erisipela, psoríase).